

Quelque extraordinaire que soit le cas rapporté, il n'est cependant pas sans précédents. Les journaux, il n'y a encore que quelques années, citaient un fait tout-à-fait analogue au cas de la Louisiane, arrivé à quelques voyageurs qui s'étaient désaltérés avec l'eau d'une source dans les montagnes de l'Ouest. D'ailleurs, ces cas d'ossification du cœur, de la plèvre etc., que nous entendons assez souvent mentionner, ne sont rien autre chose que des pétrifications semblables, mais moins étendues, dues de même à l'absorption de sels pierreux, chaux, silice etc. Voici ce que rapporte le Dr. Flint, dans son *Traité de Médecine Pratique* :

“J'ai rencontré un cas de pleurite ancienne dans lequel la plèvre s'était durcie par un dépôt calcaire à un tel point qu'elle pût être enlevée entière avec plusieurs chopines d'eau qu'elle renfermait; et lorsqu'ouverte elle fut débarrassée du liquide, elle ne s'affaissa pas, mais retint la forme d'une boîte solide.”

LES ICHNEUMONIDES DE QUEBEC

AVEC DESCRIPTION DE PLUSIEURS ESPÈCES NOUVELLES.

(Continuée de la page 452 du vol. V.)

9. GENRE. **MENISCUS**, Schiödte. (Ménisque).

(De *méniskos*, bracclet, collier ; allusion aux segments abdominaux qui paraissent comme cerclés postérieurement) .

Une tarière plus longue que la moitié de l'abdomen, forte, droite, à valves comprimées, vélues ; tels sont les caractères qui séparent les Ménisques des Lampronotes. Les tarses sont ou non pectinés.

1. **Meniscus Crevieri**. (Ménisque de Crevier). *nov. sp.*

♀.—Longueur .40 pouce. Noir ; tête et prothorax finement ponctués. Chaperon, mandibules excepté à l'extrémité, orbites étroitement, palpes, extrémité du scape en dessous, deux points audessus

des yeux, les scapulaires, un point en avant, une petite ligne au dessous des ailes antérieures avec un point au dessous des postérieures, une ligne sur le bord des lobes latéraux du mésothorax, d'un jaune clair. La poitrine, le bord inférieur du prothorax, les flancs du mésothorax, l'écusson, une ligne sur le post-écusson, avec les pattes, d'un roux plus ou moins foncé. Les lignes blanches du devant du mésothorax sont bordées de roux intérieurement. Les 4 hanches antérieures portent une ligne claire en dehors; jambes postérieures brunâtres au sommet, de même que leurs tarsi, avec un très petit anneau clair près de leur base. Ailes un peu enfumées, à nervures brunes; stigma jaunâtre; aréole petite, triangulaire, pétiolée. Abdomen un peu convexe, opaque. Tarière presque aussi longue que l'abdomen, rousse, à valves noires, hispides.

Deux Spécimens ♀. Nous dédions ce bel insecte à notre laborieux naturaliste le Dr. Crevier de Montréal.

2. *Meniscus superbus*. (Ménisque superbe). *nov. sp.*

♀—Long. .40 pouce. Noir, luisant; mandibules, palpes, o. bites, antérieurs, scapulaires, un point en avant des ailes antérieures, une ligne au dessous et un autre point plus bas, une ligne sur les bords du mésothorax, l'écusson plus ou moins, blanc. Écusson bordé de roux en arrière. Ailes hyalines, à nervures brunes, claires à la base; stigma brun; aréole petite, pétiolée. Pattes rousses; les trochantins antérieurs avec le devant de leurs hanches sont blancs; les hanches intermédiaires portent aussi une tache blanche en dehors. Cuisses postérieures à l'extrémité, leurs jambes excepté un anneau blanc à la base, leurs tarsi excepté un anneau blanc à la base du premier article, noir. Tarière un peu plus courte que l'abdomen, très forte, hispide.

Deux spécimens ♀. Ses ailes hyalines et la coloration de ses pattes postérieures distinguent à première vue cette espèce de la précédente.

11. GEN. *EUCEROS*, Grav. (Eucère).

(De *eu*, beau, et *keras*, corne; allusion aux antennes dilatées).

1. *Euceros frigidus*. Cress. (Eucère froid).

Un seul spécimens ♂.

2. *Euceros Québecensis*. (Eucère de Québec). *sp. nov.*

♀—Long. .22 pouce. Noir et jaune; tête noire, la face au dessous des antennes, les mandibules, le scape en dessous, les écailles alaires avec un point en avant, d'un blanc d'ivoire; une ligne noire transversale au dessus du chaperon, les palpes et les antennes, jaunâtres. Thorax noir, poli, brillant, d'un jaune roux sur les flancs et en

dessous; écusson noir. Ailes hyalines; stigma grand, noir avec une tache blanche à la base. Pattes d'un jaune roux, l'extrémité des jambes postérieures avec leurs tarses, noir ou brun-foncé. Abdomen large, en ovale allongée, noir, brillant, tous les segments marginés de jaune postérieurement, les segments 2 et 3 avec une fausse impression transversale au milieu; ventre blanc. Tarière jaune, du quart de l'abdomen à peu près.

Un seul spécimen ♀. Nous devons ce bel insecte à Mr. Bélanger, de l'Université Laval.

12. GEN. BASSUS, Grav. (Basse).

(De *bassos*, sentier dans les montagnes; allusion à l'habitat de ces insectes).

Insectes de taille moyenne ou petite, à premier segment abdominal déprimé et presque carré.

Abdomen entièrement noir;

Écusson noir, taché de blanc aux bords seulement;

Tarses postérieurs non annelés de noir et de brun;

Tarses postérieurs noirs..... 1. *tibialis*, *Cress.*

Tarses postérieurs jaunes ou bruns. 2. *Bouleti*, *n. sp.*

Tarses postérieurs noirs, annelés de

blanc. 3. *pectoralis*, *n. sp.*

Écusson blanc;

Les 3 premiers segments abdominaux rugueux;

Face noire; chaperon bilobé en avant 4. *amœnus*, *n. sp.*

Face blanche; chaperon droit en avant 5. *albicoxus*, *n. sp.*

Le 1er segment et la base seulement du 2e

rugueux..... 6. *Belangerii*, *n. sp.*

Abdomen plus ou moins varié de jaune ou de roux;

Segments 2, 3 et 4 sillonnés transversale-

ment..... 7. *sycophanta*, *Walsh.*

Segments moyens non sillonnés transversalement;

Hanches postérieures noires, du moins à la base;

Une aréole aux ailes antérieures. 8. *pallipennis*, *n. sp.*

Point d'aréole;

2e segment abdominal sans tache à la

base..... 9. *Ichneumonoides*, *n. sp.*

2e segment abdominal avec 2 taches jaunes, latérales, à

la base..... 10 *elongatus*, *n. sp.*

Hanches postérieures jaunes ou rousses;

Une aréole aux ailes antérieures... 11. *areolatus*, *n. sp.*

Point d'aréole..... 12. *costalis* *n. sp.*

1. **Bassus tibialis**, *Cress.* (Basse tibial).

Bassus tibialis. *Cress.* Trans. Am. Ent. Soc. II, p. 110, ♀.

Deux Spécimens ♂ et ♀.

2. **Bassus Bouleti**. (Basse de Boulet). *nov. sp.*

♀—Long. .22 pouce. Noir; tête et prothorax couverts d'une pubescence grisâtre; chaperon brun, base des mandibules, palpes, écailles alaires avec 2 points en avant, blanc. Antennes à articles courts, brunâtres en dessous. Ecusson noir, sans tache. Ailes légèrement enfumés, pâles à la base: nervures et stigma noirs, ce dernier avec une tache à la base. Métathorax avec carènes très soulevées. Pattes rousses; cuisses postérieures tachées de noir à l'extrémité, leurs jambes et leurs tarses, noirs, les premières avec un anneau blanc au milieu, les seconds blancs à la base des articles. Ablomen à 1er segment bi-caréné, large, les derniers polis, brillants. Un seul spécimen.


Nous dédions avec plaisir ce bel insecte à M. Philéas Boulet, jeune entomologiste plein d'ardeur pour l'étude de la nature. -

3. **Bassus pectoralis**. (Basse pectoral). *nov. sp.*

♂—Long. .20 pouces. Noir; toute la face au-dessous des antennes, les orbites au-dessus des yeux, le scape inférieurement, les écailles alaires, une tache en crochet sur les lobes du mésothorax en avant, une bande aux côtés du prothorax, la poitrine, une ligne au-dessous des ailes, une bande plus bas sur les flancs du mésothorax, les 4 pattes antérieures avec leurs hanches, les trochantins, d'un jaune pâle. Ailes hyalines, nervures brunes, stigma jaune; aréole petite, oblique, pétiolée. Pattes postérieures d'un jaune roux, leurs jambes blanches, brunes à l'extrémité de même que leurs tarses. Abdomen rugueux seulement sur le 1er segment et la base du 2e.

Un seul spécimen.

(A continuer).



Honneur à Agassiz.—La chambre des députés du canton de Neufchatel, Suisse, vient de décider de faire faire le portrait en pied d'Agassiz, pour le placer dans l'enceinte de la Chambre de la ville de Neufchatel, où le grand naturaliste a commencé à se faire connaître.